

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

834 AD

Tamaño: Pequeño o mediano.

Forma: Turbinada breve o esferoidal. Con cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular, con tendencia a pentagonal o elíptico.

Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial. **Pedúnculo:** Corto. Fino, ligeramente engrosado en su extremo superior. Semicarnoso en la base. Recto. Implantado ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: Estrecha o de mediana anchura. Poca o medianamente profunda. Borde ondulado. **Ojo:** Mediano. Abierto. Sépalos erectos.

Piel: Apergaminada total o parcialmente ruginosa. **Color:** Ruginoso bronceado, en general suave y fino, compacto o en forma de maraña sobre fondo amarillo dorado con salpicaduras rojizas. Zona ruginosa algo mas basta formando anillos concéntricos en la cavidad del ojo.

Tubo del cáliz: Mediano, en forma de embudo ancho y poco profundo con conducto amplio, más ensanchado hacia el corazón, corto o mediano.

Corazón: Pequeño o mediano. Redondeado. Eje muy variable, ancho o estrecho, abierto, lanoso. Celdillas amplias y cortas.

Semillas: Tamaño mediano. Elíptico redondeadas. Ganchudas en la inserción, con punto redondeado. Color castaño rojizo o casi negro.

Carne: Blanca o blanco amarillenta, con ligero tinte verdoso bajo la piel. Granulosa, crujiente. **Sabor:** Dulce pero soso y sin aroma.

Maduración: Otoño - Invierno.

